

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭСКУЗАН®

Регистрационный номер:
П N013385/01 от 30.12.2011

Торговое название препарата:
ЭСКУЗАН®

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь

Состав:

100 г препарата содержат:

Активные компоненты:

Конского каштана семян
экстракт сухой (5-7:1) 4,725 г

Hippocastani extractum siccum normatum
(экстрагент этанол 60 % об/об)

Тиамин гидрохлорид 0,50 г

Вспомогательные вещества:

Этанол 96 % 26,400 г

Вода очищенная 67,675 г

Лактоза моногидрат 0,432 г

Кремния диоксид коллоидный 0,243 г

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость от желтого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Венотонизирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: С05СХ

Фармакологические свойства

Оказывает антиэкссудативное и венотонизирующее действие. Установлено, что экстракт семян конского каштана уменьшает концентрацию лизосомальных ферментов, в результате

чего, снижается распад мукополисахаридов в области стенок капилляров. Эскузан® снижает проницаемость сосудов, предотвращая фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство.

Показания

Хроническая венозная недостаточность I-III класса по классификации СЕАР: варикозное расширение вен, отеки, судороги в икроножных мышцах, чувство тяжести в ногах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст (старше 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием достаточных исследований препарат не рекомендуется принимать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат принимать внутрь перед едой по 12-15 капель 3 раза в день, перед употреблением развести в не-

большом количестве воды. Длительность терапии определяется лечащим врачом. Перед применением взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, головные боли, головокружение.

Передозировка

При передозировке возможно появление чувства тяжести в эпигастральной области. Препарат следует отменить. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Действие тиаминa уменьшается при одновременном применении с сульфитосодержащими инфузионными растворами. Фторурацил, винбластин, блеомицин, цисплатин нарушают усвоение витамина В1. Пеницилламин, изониазид снижают эффективность витамина В1, увеличивая его выведение.

Особые указания

Препарат содержит 31 % этанола. При соблюдении рекомендуемых дозировок при каждом приеме препарата в организм поступает до 0,128 г этанола, в максимальной суточной дозе препарата содержится до 0,384 г этанола.

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

При длительном хранении препаратов (жидких лекарственных форм) на

основе лекарственного растительного сырья возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество препарата.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь.

По 20 мл во флакон темного стекла с пробкой-капельницей и навинчивающейся пластмассовой крышкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре от 8° до 25° С. **Хранить в месте, недоступном для детей!**

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Фарма Вернигероде ГмбХ
Дорнбергсвег 35
38855 Вернигероде, Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Эспарма ГмбХ,
Билефельдер штрассе 1,
39171 Зюльцеталь, Германия.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

Представительство фирмы «Эспарма ГмбХ» (Германия) г. Москва:

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 16, 6 этаж,
комн. 21/1, 23-27
тел.: +7 (499) 579 33 70
факс: +7 (499) 579 33 71
e-mail: info@esparma-gmbh.ru