

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ЭСКУЗАН®, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Действующие вещества: Конского каштана обыкновенного семян экстракт + Тиамин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Эскузан® и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед применением препарата Эскузан®.
3. Применение препарата Эскузан®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Эскузан®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. Что из себя представляет препарат Эскузан® и для чего его принимают

Препарат Эскузан® содержит конского каштана обыкновенного семян экстракт сухой, тиамина гидрохлорид и представляет собой лекарственное средство растительного происхождения, повышающее способность капилляров сохранять целостность, способствующее улучшению микроциркуляции крови. Лекарственный препарат применяется для облегчения боли и симптомов «усталости» ног (ощущение тяжести и распираания в ногах, судорог), снятия отека ног.

### Показания к применению

Препарат Эскузан® применяется у взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше для лечения следующих заболеваний:

- симптомы и проявления венозно-лимфатической недостаточности (боль и «усталость» ног, ощущение тяжести и распираания в ногах, судороги нижних конечностей, отечность ног);
- варикозное расширение вен нижних конечностей.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед применением препарата Эскузан®**

### **Противопоказания**

Не применяйте препарат Эскузан®:

- если у Вас аллергия на компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас заболевания печени.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Эскузан® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите Вашему врачу, если у Вас есть или когда-либо были следующие проблемы, перед тем как Вы начнете лечение, поскольку они могут усугубиться в процессе лечения препаратом Эскузан®:

- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга.

При длительном хранении препаратов (жидких лекарственных форм) на основе лекарственного растительного сырья возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество препарата.

### **Дети и подростки:**

Не давайте препарат детям от 0 до 12 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Эскузан® у детей в возрасте до 12 лет не установлены.

Перед тем, как дать препарат Эскузан® детям старше 12 лет, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Другие препараты и препарат Эскузан®**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу если вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов:

- фторурацил (препарат для лечения злокачественных новообразований);
- винбластин (противоопухолевое средство, алкалоид);
- блеомицин (противоопухолевый антибиотик);
- цисплатин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение);
- пеницилламин (комплексобразующее соединение, антагонист пиридоксина);
- изониазид (противотуберкулезное средство);
- сульфитосодержащие инфузионные растворы.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Применение лекарственного препарата Эскузан® во время беременности, в период грудного вскармливания и у женщин способных забеременеть, не использующих контрацепцию, не рекомендуется.

#### *Беременность*

Подтвержденных данных о нежелательном действии лекарственного препарата Эскузан® при беременности нет.

#### *Лактация*

Подтвержденных данных о нежелательном действии лекарственного препарата Эскузан® в период грудного вскармливания нет.

#### *Фертильность*

Данные по влиянию на фертильность отсутствуют.

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат Эскузан® оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и на работу с механизмами в связи с незначительным содержанием этанола.

### **Препарат Эскузан® содержит лактозу**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

### **Препарат Эскузан® содержит этанол**

Препарат содержит 31 об. % этанола (алкоголя), то есть до 0,128 г этанола на дозу, что равно 4 мл пива или 2 мл вина на дозу.

### **3. Прием препарата Эскузан®**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

#### **Рекомендуемая доза:**

12-15 капель три раза в день.

#### **Способ применения:**

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат принимать внутрь перед едой в течение дня, перед употреблением развести в небольшом количестве воды (примерно 1/3 стакана).

Перед применением необходимо взбалтывать препарат во флаконе.

#### **Продолжительность применения**

Длительность лечения определяется лечащим врачом.

#### **Если Вы приняли препарат Эскузан® больше, чем следовало**

При передозировке возможно появление ощущения тяжести в эпигастральной области. В этом случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **Если Вы забыли принять препарат Эскузан®**

Пропустите прием этой дозы препарата. Примите следующую дозу в надлежащее время.

Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

*Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.*

#### **Наиболее серьезные нежелательные реакции, о которых сообщалось при применении препарата Эскузан®.**

Неизвестно — исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны кожный зуд, покраснения, высыпания на коже и т.д. (аллергическая реакция).

Прекратите прием препарата Эскузан® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения любой из вышеуказанных серьезных нежелательных реакций.

Другие нежелательные реакции, о которых сообщалось при применении препарата Эскузан®.

Неизвестно — исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

- головная боль;
- головокружение;
- раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (тошнота, диспепсия).

#### **Сообщения о нежелательных реакциях:**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке - вкладыше.

В также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **Российская Федерация**

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Тел./Факс: +7 (495) 624-80-90

Эл. почта: [info@roszdravnadzor.ru](mailto:info@roszdravnadzor.ru)

<http://www.roszdravnadzor.ru>

#### **Республика Казахстан**

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, БЦ «Нурсаулет»

Тел.: +7 (7172) 78-99-02

Эл. почта: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)

<https://www.ndda.kz/>

#### **Республика Беларусь**

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Тел./Факс: +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

### **Кыргызская Республика**

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25

Тел./Факс: +996 (312) 21-05-08

Эл. почта: [vigilance@pharm.kg](mailto:vigilance@pharm.kg)

<http://www/pharm.kg>

### **Республика Армения**

Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна АОЗТ в республике Армения

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/4

Тел.: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

Эл. почта: [admin@pharm.am](mailto:admin@pharm.am)

### **5. Хранение препарата Эскузан®**

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке, после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре от 8 °С до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

#### **Препарат Эскузан® содержит:**

Действующими веществами являются конского каштана обыкновенного семян экстракт + тиамин.

100 г препарата Эскузан содержат: 5,4 г Конского каштана обыкновенного семян (Aesculi hippocastani semina) экстракта сухого (5-7):1, что соответствует 0,95 – 1,05 г суммы тритерпеновых гликозидов в пересчете на эсцин, 0,5 г тиамина гидрохлорида.

Экстрагент: Этанол (Спирт этиловый) 60% об/об

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный, этанол 96 %, вода очищенная.

### **Внешний вид препарата Эскузан® и содержимое упаковки**

Капли для приема внутрь

Препарат представляет собой прозрачную или слегка мутную жидкость от желтого до красновато-коричневого цвета, с характерным запахом. В процессе хранения возможно образование осадка.

20 мл препарата во флакон темного стекла, снабженный пластмассовой пробкой-капельницей и навинчиваемой пластмассовой крышкой. По одному флакону в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

### **Держатель регистрационного удостоверения**

Германия

Аристо Фарма ГмбХ

Валленродер штрассе 8-10, 13425 Берлин

### **Производитель**

Германия

Фарма Вернигероде ГмбХ

Дорнбергсвег 35, 38855 Вернигероде

**За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения**

*В Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике*

ООО «Аристо Фарма»

125171, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д.16А,  
стр.3

Тел.: +7(495)909-00-55

8-800-555-75-75

E-mail: [info@aristo-pharma.ru](mailto:info@aristo-pharma.ru)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза (<https://eec.eaeunion.org>).

Листок – вкладыш доступен на всех языках Союза на веб – сайте Союза.